

# Confusion Assessment Methode voor de ICU (CAM-ICU)

## Stap 2 Delirium Assessment

### 1. Acuut begin en fluctuerend beloop

- A. Zijn er aanwijzingen voor een acute verandering in het psychisch/  
cognitief functioneren vergeleken met hoe het was in het begin? **OF**  
B. Fluctueerde het gedrag gedurende de afgelopen 24 uur?

nee

CAM-ICU  
negatief  
geen delier

Ja

### 2. Verminderde aandacht

“Knijp in mijn hand als ik de letter A noem”

Noem de volgende reeks letters **SAVE AHAART**

Fout: Geen geknijp bij de A en/of knijp bij andere letter dan de A

Indien niet in staat de letter test te doen dan de plaatjes gebruiken

0-2 fouten

CAM-ICU  
negatief  
geen delier

>2 fouten

### 3. Veranderd bewustzijnsniveau

Huidige RASS score (denk hierbij aan de RASS score bij stap 1)

RASS  
anders dan 0

CAM-ICU positief  
Delier

RASS = 0

### 4. Ongeorganiseerd denken

1. Blijft een steen drijven op het water?
  2. Zijn er vissen in de zee?
  3. Weegt 1 pond meer dan 2 pond?
  4. Kun je met een hamer een spijker inslaan?
- Opdrachten; “ Steek u eens zoveel vingers op? (steek 2 vingers omhoog)  
“ Doe dit nog eens met de andere hand? (niet voordoen)  
of “ Doe er een vinger bij? (Als de patiënt maar 1 arm kan gebruiken)

> 1 fout

0- 1 fout

CAM-ICU  
negatief  
geen delier

## RICHMOND AGITATION-SEDATION SCALE (RASS)

### Stap 1 Sedatie Assessment

Schaal	Label	Beschrijving
+4	Strijdlustig	Oppositioneel/vijandig, gewelddadig, direct gevaar voor personeel
+3	Erg geagiteerd	Trekt aan of verwijderd katheter(s) of tube(s); agressief
+2	Geagiteerd	Regelmatig niet doelgerichte bewegingen, afwerende reactie
+1	Onrustig	Angstig maar bewegelijkheid is niet agressief krachtig
0	Alert/kalm	
-1	Slaperig	Niet volledig alert maar is in staat wakker te blijven (ogen open/oogcontact) bij stemgeluid (> 10 sec)
-2	Lichte sedatie	Kort wakker met oogcontact bij stemgeluid (< 10 sec)
-3	Matige sedatie	Beweging of ogen open bij stemgeluid (geen oogcontact)

➔ Als RASS  $\geq$  3 start de CAM-ICU afnemen (is de CAM-ICU positief of negatief?)

**-4 Diepe sedatie** Geen reactie op stemgeluid, maar wel beweging en ogen open bij lichamelijke prikkeling

**-5 Niet wekbaar** Geen reactie op stemgeluid of lichamelijke prikkeling

➔ Als de RASS -4 of -5 is stoppen, (patiënt is bewusteloos), probeer later nog eens.