



## EFTER BORING TIL KRONE/BRO

Tandlægen har nu boret, så tanden har den endelige form og nu er forsynet med en midlertidig fyldning / krone / bro.

### **Efter behandling**

Når bedøvelsen forsvinder, er det muligt at tanden er følsom overfor kulde, varme og måske sødt.

Bliver det for meget, må du gerne tage en ibumetin/ibuprofen/ipren 600mg og to panodil, hjælper det ikke skal du kontakte os.

### **Vigtigt**

Hvis du mister den midlertidige fyldning / krone / bro eller den løsner sig, skal du kontakte os med det samme.

Årsagen hertil er, at den midlertidige tand ikke er fastlåst af nabotænderne, dvs. hvis du taber den midlertidige fyldning / krone / bro kan du risikere at tanden flytter sig, sådan at den endelige krone eller bro ikke passer.

### **Den nye krone/bro**

Hvis ikke andet er aftalt kontakter vi dig når krone / bro er hos os, det tager normalt ca. 10 hverdagedage. I ferieperioder kan det tage lidt længere tid.

*Med venlig hilsen*

Tandlægehuset i Frejlev

[www.frejlevtand.dk](http://www.frejlevtand.dk)

Vidste du, at du kan booke  
tid online!

[www.frejlevtand.dk](http://www.frejlevtand.dk)