



Fruitvlieg

Latijns:	Drosophila species
Familie:	Fruitvliegen
Orde:	Tweevleugelingen
Status:	Niet beschermd



Uiterlijk en kenmerken

Een volgroeide fruitvlieg is ca. 3-4 mm lang en is geelbruin tot zwart van kleur, afhankelijk per soort. Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood en vertoont het achterlijf bruine dwarsstrepen.

Ontwikkeling en leefwijze

Fruitvliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). De ontwikkeling van ei tot volwassen fruitvlieg duurt ca. 8-11 dagen en vindt meestal plaats in rottend, gistend materiaal. Het wijfje legt ca. 400 tot 900 eitjes. Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (om in vloeistof te kunnen ademen). Een fruitvlieg leeft ca. 2 tot 9 weken.

Schuilplaatsen

- Fruitvliegen komen vaak voor in o.a. de levensmiddelenindustrie, keukens, horeca (achter de tap) maar ook in stallen en voerkeukens van diervoeders.

Wering

- Groente en fruit niet onafgedekt en bij voorkeur niet te lang bewaren.
- Afvalcontainers en containers afsluiten. Indien mogelijk, dagelijks legen en reinigen.
- Afvoerputjes schoonhouden en zorgvuldig naspoelen.

- Veehouderij:
 - geen voerrestanten in de stallen achterlaten.
 - stallen regelmatig opruimen en reinigen.
 - brei(voer)keukens regelmatig reinigen.

Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een schoonmaakplan op.

Bestrijding

Neem direct de bron weg en reinig de omgeving vervolgens grondig. Indien noodzakelijk, kunt u een (plaatselijke) chemische bestrijding laten uitvoeren door ten Dijk Plagdierbeheersing.