



ten Dijk
Plaagdierbeheersing



De Kauw

Latijns: Corvus Monedula L.
Familie: Kraaien
Orde: Zangvogels
Status: Beschermde diersoort

Uiterlijk en kenmerken

Kenmerkend kleur van de kauw is de grijze kleur van de zijhals en het achterhoofd en de lichtgroen-grijze oogring. Vrijwel volledig zwarte exemplaren komen overigens ook voor. De kauw is kleiner dan andere kraaien (ca. 33cm) en beweegt sneller loopt met de kop knikkend rechtop.

Ontwikkeling en leefwijze

Kauwen nestelen zich meestal in groepen in bomen, elders ook wel op rotswanden en in schoorstenen. De 4 tot 5 eieren worden 16 à 17 dagen bebroed en de jongen vliegen na ongeveer 30 à 35 dagen uit, broeden doen ze slecht 11x per jaar. Een kauwen paar blijft bij elkaar tot de dood hen scheidt. Kauwen komen meestal in groepen of paren voor en foerageren vaak gezamenlijk in weilanden en wegbermen, ook in steden worden ze met regelmaat gesignaleerd.

Kauwen zijn bereid dagelijks lange voedselvluchten te maken. Kauwen hebben een zeer uitgebreid menu, dat voornamelijk bestaat uit kleine ongewervelde dieren zoals insecten (slakken en spinnen), zaden, granen, eieren en fruit. In de omgeving van de mens doen kauwen zich ook tegoed aan afval, kattenbrokken en karkassen van overreden dieren.

Schuilplaatsen

In nesten in bomen en soms in dakgoten.

Mogelijke risico's, schade of hinder

De kauw brengt ernstige schade toe aan gazons en sportvelden tijdens het zoeken naar insecten larven (Engerlingen en emelten). Geluidsoverlast en bevuiling door uitwerpselen brengen schade toe aan rietdaken.

Sporen

- Uitwerpselen

Wering

Rustplaatsen onbereikbaar maken d.m.v. netten en draad systemen. Verjagen door middel van het voortbrengen van angst kreten van dezelfde vogel. Gekken plaatsen op schoorstenen.

Advies: Goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod.